28 DE ANI
National
Cotidian fondat în 1997

Scris de **Claudia Marcu** 2025-10-29

Autismul, legat oficial de vaccinuri. Prioritate urgentă de sănătate publică!

Raportul Fundației McCullough din SUA, realizat de un grup de cercetători de renume, care vizează determinanții tulburării din spectrul autist, vine cu dezvăluiri cutremurătoare. Autismul este legat oficial de vaccinuri, în special de administrarea combinată a acestora la vârste de până în 2 ani. Același avertisment l-au dat și medicii pediatri români, care au atras atenția că vaccinurile trivalente administrate copiilor cu vârste de până în doi ani provoacă nu numai autism, ci și probleme grave imunologice. Concluzia cercetătorilor americani a fost că riscurile asociate cu dozarea și momentul administrării cumulative a vaccinului constituie o prioritate urgentă de sănătate publică.

MCCULLOUGH™ FOUNDATION REPORT

Determinants of Autism Spectrum Disorder

Nicolas Hulscher, MPH[1], John S. Leake, MA[1], Simon Troupe, MPH[1], Claire Rogers, MSPAS, PA-C[1], Kirstin Cosgrove, BM, CCRA[1], M. Nathaniel Mead, MSc, PhD[1], Breanne Craven, PA-C[1], Mila Radetich[1], Andrew Wakefield, MBBS[2], Peter A. McCullough, MD, MPH[1]



Figure 3. Multifactorial Determinants of Autism Spectrum Disorder. DOI 10.5281/zenodo.17451259

Tulburarea din spectrul autist (TSA) afectează acum mai mult de 1 din 31 de copii din Statele Unite, prevalența acesteia crescând brusc în ultimele două decenii și reprezentând o povară tot mai mare pentru familii și sistemele de sănătate publică, se arată în raportul Fundației McCullough din SUA. Raportul a reușit să sintetizeze întreaga gamă de dovezi pentru a clarifica factorii care contribuie la riscul de TSA. Astfel, cercetătorii Fundației McCullough au examinat în mod cuprinzător studiile epidemiologice, clinice și mecanistice care au evaluat potențialii factori de risc pentru TSA, evaluând rezultatele, cuantificarea expunerii, puterea și independența asocierilor, relațiile temporale, validitatea internă și externă, coeziunea generală și plauzibilitatea biologică. Din 136 de studii care au examinat vaccinurile infantile sau excipienții acestora, 29 au găsit riscuri neutre sau nicio asociere, în timp ce 107 au dedus o posibilă legătură între imunizare sau componentele vaccinului și TSA sau alte tulburări de neurodezvoltare (TND), pe baza constatărilor care acoperă dovezi epidemiologice, clinice, mecanistice, neuropatologice și din rapoarte de caz privind regresia dezvoltării.

Riscuri mai mici pentru nevacccinați

12 studii care au comparat copiii sau adulții tineri imunizați de rutină cu cei complet nevaccinați au demonstrat în mod constant rezultate generale superioare în ceea ce privește sănătatea în rândul celor nevaccinați, inclusiv riscuri semnificativ mai mici de probleme medicale cronice și tulburări neuropsihiatrice, cum ar fi TSA, se precizează în raport.

Lucrările privind asocierea neutră au fost subminate de absența unui grup de control cu adevărat nevaccinat – cu imunizare parțială sau neverificată chiar și în rândul celor clasificați drept nevaccinați – alături de clasificarea greșită în registru, confuzia ecologică și estimările medii care ascund efectele în cadrul subgrupurilor vulnerabile. Doar câteva studii caz-control au verificat vaccinarea prin dosare medicale sau carduri deținute de părinți și niciunul nu a efectuat evaluări clinice independente ale copiilor pentru TSA.

În schimb, studiile de asociere pozitivă au constatat că atât semnale populaționale (ecologice, de cohortă, caz-control, doză-răspuns și clustering temporal), cât și constatări mecanistice converg către plauzibilitatea biologică: disfuncție mitocondrială și neuroimună indusă de antigen, conservant și adjuvant (etilmercur și aluminiu), leziuni ale sistemului nervos central și expresie fenotipică incipientă a TSA (tulburări ale spectrului autist). Dozarea grupată a vaccinurilor și momentul mai timpuriu al expunerii în timpul ferestrelor critice de neurodezvoltare par să crească riscul de TSA. Aceste constatări sunt paralele cu creșteri puternice și constante ale expunerii cumulative la vaccin în timpul copilăriei timpurii și cu prevalența raportată a autismului în cohortele de nașteri successive, arată cercetătorii.

Studiile de siguranță pentru copii, inexistente

Autorii raportului semnalează că, până în prezent, niciun studiu nu a evaluat siguranța întregii scheme cumulative de vaccinare pediatrică pentru rezultatele neurodezvoltării până la vârsta de 9 sau 18 ani. Aproape toate cercetările existente s-au concentrat pe un subset restrâns de vaccinuri sau componente individuale, produse care conțin timerosal sau produse cu adjuvant de aluminiu – ceea ce înseamnă că doar o mică parte din expunerea totală la vaccinuri din copilărie a fost vreodată evaluată pentru asocieri cu TSA sau alte tulburări neurodegenerative.

”Vaccinarea combinată și vaccinarea de rutină precoce în copilărie constituie cel mai semnificativ factor de risc modificabil pentru TSA, susținută de constatări mecanistice, clinice și epidemiologice convergente și caracterizată prin utilizarea intensificată, gruparea dozelor multiple în timpul ferestrelor critice de neurodezvoltare și lipsa cercetării privind siguranța cumulativă a schemei pediatrice complete. Deoarece prevalența TSA continuă să crească într-un ritm fără precedent, clarificarea riscurilor asociate cu dozarea și momentul administrării cumulative a vaccinului rămâne o prioritate urgentă de sănătate public”, au concluzionat cercetătorii.